

Primitivní funkce, neurčitý integrál, základní integrály

1. Definice Říkáme, že $F(x)$ je v intervalu (a, b) **primitivní funkcí** k funkce $f(x)$, jestliže pro všechna $x \in (a, b)$ platí $F'(x) = f(x)$.

2. Věta Ke každé funkci $f(x)$ spojitě na (a, b) existuje v (a, b) primitivní funkce. Je jich dokonce nekonečně mnoho. Je-li $F(x)$ jedna z nich, pak všechny ostatní mají tvar

$$F(x) + C,$$

kde C je **integrační konstanta**, která je libovolná.

3. Poznámka Používáme formální zápis

$$\int f(x) dx = F(x) + C,$$

$\int f(x) dx$ znamená množinu všech primitivních funkcí k funkce $f(x)$ a nazývá se **neurčitý integrál funkce $f(x)$** .

4. Poznámka Je zvykem pracovat se symbolem $\int f(x) dx$ jako s jednou z primitivních funkcí a ve výsledku připsat integrační konstantu C .

5. Platí: $(F(x) + C)' = f(x) \Leftrightarrow F(x) = \int f(x) dx$.

6. Příklad

$$(\sin x + 5)' = \cos x;$$

$$(\sin x - 6)' = \cos x.$$

$$\text{Tedy } \int \cos x dx = \sin x + C.$$

7. Věta Přehled základních integračních vzorců

$$1. \int x^n dx = \frac{x^{n+1}}{n+1} + C, \quad x > 0, n \in \mathbf{R}, n \neq -1.$$

$$2. \int \frac{1}{x} dx = \ln |x| + C, \quad x \neq 0.$$

$$3. \int e^x dx = e^x + C.$$

$$4. \int a^x dx = \frac{a^x}{\ln a} + C, \quad a > 0, a \neq 1.$$

$$5. \int \sin x dx = -\cos x + C.$$

$$6. \int \cos x dx = \sin x + C.$$

$$7. \int \frac{1}{\sin^2 x} dx = -\cotg x + C, \quad x \neq k\pi, k \in \mathbf{Z}.$$

$$8. \int \frac{1}{\cos^2 x} dx = \tg x + C, \quad x \neq \frac{\pi}{2} + k\pi, k \in \mathbf{Z}.$$

$$9. \int \frac{1}{1+x^2} dx = \arctg x + C_1 = -\operatorname{arccotg} x + C_2.$$

$$10. \int \frac{1}{\sqrt{1-x^2}} dx = \arcsin x + C_1 = -\arccos x + C_2, \quad x \in (-1, 1).$$

$$11. \int \frac{1}{\sqrt{x^2+a}} dx = \ln(x + \sqrt{x^2+a}) + C, \quad a > 0.$$

$$12. \int \frac{1}{x^2+a^2} dx = \frac{1}{a} \arctg \frac{x}{a} + C, \quad a \neq 0.$$

$$13. \int \frac{f'(x)}{f(x)} dx = \ln |f(x)|.$$

8. Poznámka Přestože ke každé spojitě funkci existuje primitivní funkce, nelze v mnoha případech tuto primitivní funkci vyjádřit pomocí elementárních funkcí.

Integrační metody

9. Věta Existují-li k funkcím $f_1(x)$, $f_2(x)$, $f(x)$ primitivní funkce, pak

1. $\int (f_1(x) \pm f_2(x)) dx = \int f_1(x) dx \pm \int f_2(x) dx$.
2. $\int k \cdot f(x) dx = k \int f(x) dx$, kde k je konstanta.

Jednou z integračních metod je **přímá integrace**.

10. Příklad Spočtěte integrály:

1. $\int \frac{5x^2-3}{\sqrt{x}} dx$.
2. $\int \left(3x^2 - 2x + \frac{1}{\sqrt{x^3}}\right) dx$.
3. $\int \frac{3^x \cos^2 x - 5}{\cos^2 x} dx$.
4. $\int \cotg x dx$.
5. $\int \frac{\sqrt{x^4+2+x^{-4}}}{x^3} dx$.
6. $\int \frac{1}{x \ln x} dx$.
7. $\int x(x-2)(x-3) dx$.

Další možností je řešení integrálů **substituční metodou**. Tu si ukážeme na následujících příkladech.

11. Příklad

1. $\int \cos(5x+6) dx$.
2. $\int \frac{1}{x \ln x} dx$.
3. $\int \sin^2 x \cos x dx$.
4. $\int x \sqrt{x^2+1} dx$.
5. $\int \frac{\sqrt[3]{\arctg x}}{1+x^2} dx$.
6. $\int \frac{\sin x}{\sqrt[3]{1+2 \cos x}} dx$.
7. $\int \frac{1}{x \sqrt{3-\ln^2 x}} dx$.

12. Poznámka Počítáme-li integrály $\int \sin^2 x dx$, $\int \cos^2 x dx$, tak před vlastní integrací nejprve použijeme úpravu:

$$\sin^2 x = \frac{1 - \cos 2x}{2}, \quad \cos^2 x = \frac{1 + \cos 2x}{2}.$$

13. Příklad $\int \sin^2 x dx$.

Velmi užitečná je i integrace **per partes**.

14. Věta Metoda per partes (po částech)

Mají-li funkce $u(x)$ a $v(x)$ v intervalu (a, b) spojitou derivaci, pak v intervalu (a, b) platí

$$\int u(x) \cdot v'(x) dx = u(x) \cdot v(x) - \int u'(x) \cdot v(x) dx. \quad (1)$$

15. Důkaz: Stačí si uvědomit, jak se derivuje součin funkcí $u \cdot v$:

$(u \cdot v)' = u'v + uv'$. Nyní obě strany rovnice zintegrujeme:

$\int (u \cdot v)' dx = \int u'v dx + \int uv' dx$. Odtud:

$u \cdot v = \int u'v dx + \int uv' dx$, což je dokazované tvrzení.

16. Poznámka Z důkazu je jasně vidět, že integrace per partes může být zapsána v ekvivalentním tvaru

$$\int u'(x) \cdot v(x) dx = u(x) \cdot v(x) - \int u(x) \cdot v'(x) dx.$$

17. Poznámka Typické příklady, kdy je vhodné použít integraci per partes ($p_n(x)$ je polynom stupně n).

Značení používáme ze vztahu (1):

$$\left. \begin{array}{l} \int p_n(x) \cdot e^x dx, \\ \int p_n(x) \cdot \sin x dx, \\ \int p_n(x) \cdot \cos x dx, \end{array} \right\} \text{zde volíme za funkci „kterou budeme derivovat“ polynom } p_n(x) = v(x).$$

$$\left. \begin{array}{l} \int p_n(x) \cdot \ln x dx, \\ \int p_n(x) \cdot \arcsin x dx, \\ \int p_n(x) \cdot \operatorname{arctg} x dx, \end{array} \right\} \text{zde volíme za funkci „kterou budeme integrovat“ polynom } p_n(x) = u'(x).$$

18. Příklad

1. $\int (1+x)e^x dx$.
2. $\int xe^{-x} dx$.
3. $\int \operatorname{arctg} x dx$.
4. $\int \ln x dx$.
5. $\int \cos(\ln x) dx$.

Pokud integrujeme **racionálně lomenou funkci** $R(x) = \frac{P(x)}{Q(x)}$, pak ji nejprve převedeme na parciální zlomky a ty již snadno zintegrujeme.

19. Příklad

1. $\int \frac{x^4+6x^2+x-2}{x^4-2x^3} dx$.
2. $\int \frac{x}{(x-1)(x+1)^2} dx$.
3. $\int \frac{5}{(2x-3)^7} dx$.
4. $\int \frac{11x^2+2x-33}{x^2-3} dx$.

Integrujeme-li **goniometrické funkce**, tj. $\int R(\sin x, \cos x)$, pak nejčastěji postupujeme substitucí. O vhodné volbě substituce rozhodneme až u konkrétního příkladu. Určitá pravidla ovšem platí obecně:

$R(\sin^n x, \cos^m x)$, kde m je sudé číslo a n je liché číslo ... substituce $\sin x = t$;

$R(\sin^n x, \cos^m x)$, kde m je liché číslo a n je sudé číslo ... substituce $\cos x = t$;

$R(\sin^n x, \cos^m x)$, kde m je liché číslo a n je liché číslo ... substituce $\operatorname{tg} x = t$.

Ve všech případech lze využít tzv. univerzální substituci $\operatorname{tg} \frac{x}{2} = t$.

20. Příklad

1. $\int \sin^3 x \, dx$;

2. $\int \frac{\cos^5 x}{\sin^4 x} \, dx$;

3. $\int \frac{\sin x - \cos x}{\sin x + 2 \cos x} \, dx$;

4. $\int \frac{2 - \sin x}{2 + \cos x} \, dx$.